

nam cauiam huc decumbat, eodemque colligatur. Deinceps haec interior propago notatu digni diffundit ramum, qui in uiris dextrum uescicae latus amplectitur, & in plures scissus furculos, uescicae ceruicem seu penem adit, in eumque numerose digeritur, ea semper serie ut ceruici crassiores amplioresque furculi, quam uescicae fundo exporrigantur. In mulieribus uero praesens ramus ab interna diductus propagine pingui membrana suffulcitur, ac quibusdam furculis uescicam quidem adit, uerum frequentioribus inferiorem fundi uteri sedem intercurrit, ramulos quoque spectabiles in uteri ceruicem dispergens, per quos uirginibus & nonnullis mulieribus, quae primis mensibus utero gerunt, menstruae purgationes colari dissectionum professoribus uisum est: quamquam & in reliquis mulieribus ab harum propaginum oris non minimum eius sanguinis profluere adhuc existimem. Arabum nonnulli quinque numero uenulas in medium longitudinis uteri ceruicis diffundi astruunt, & dextrarum uenarum ora cum sinistrarum oris coniungere committique, ac ab illis puellarum hymen constitui docent, uenarum huc pertinentium copia (ut in Arabum interpretum libris legitur) centonem nuncupantes. Quod uero interioris rami sinistri trunci eius supra os sacrum factae diuisionis adhuc reliquum est, ad pubis os contendit, & ab externo ramo trunci uenae cauae sobolem assumit, quae cum eo interioris rami reliquo congreffa, unam cum ipso uenam efformat, quae primum peritonaeum, ac dein decimum femur mouentium perforat musculum, & ossis pubis foramen permeans in crus emergitur, proprium sinum in elatiori eius foraminis sede sibi uen dicens, quo simul cum sua coniuge arteria ac item neruo fertur, ac foraminis eius membranam, & nonum femoris motus autorem musculum transiens, illis quos perreptat musculus ramos porrigit. Quando autem in crus pertendit, in musculos a pubis osse principium ducentes digeritur, in elatorem uidelicet secundi tibiae mouentis musculi sedem, qui a pubis ossium commissura enascitur. Humilior enim eius musculi pars a maiori crus petenti uena ramos sibi asciscit. Dein ab hac pubis ossis foramen transeunte uena, rami in quinti femur mouentis musculi partem a pubis osse pronatam, ac postmodum in octauum femur mouentem musculum & penis etiam musculos digeruntur, a quibus furculi nimis quam exiles in femoris internae sedis cutem in inguinum regione prodeunt. Praeter ramos autem illis musculis & cuti exporrectos, unus etiam articulum coxendicis accedit, proprio sinu coxendicis ossis acetabulum priuatim subiens. Et utique multifariam haec crus petens uena digeritur, rarius medium longitudinis femoris superat, sed interdum praecipuus ipse ramus quinto femur mouenti musculo dispensatus, propagini commiscetur, quae huc pertinet a maiori uena in crus deducta. Exterior uenae cauae trunci ramus, quem oblique crus accedit, priusquam peritonaeum perforat, ab elatiori ipsius sede uenam mediocri magnitudinis expromit, quae sursum ad abdominis anteriora per peritonaeum ducta, ipsi ramulos quosdam utrobique communicat. Vbi haec ad istum modum peritonaeo connexa ad rectum abdominis musculum descendit, peritonaeum perforans in internam posteriorem uer recti abdominis musculi sedem inferitur, & utrinque uarias soboles in transuersum abdominis musculum, & ipsi incumbentes obliquos reliquosque proximas sedes distribuit, recto tramite sursum sub recto musculo protensus. Vbi uero ad abdominis medium paulo supra umbilici regionem prorepsit, ipsius extremum in plures furculos diffeminatur, qui ramulos spectant, quos a uena sub pectoris osse ab elatiori thoracis sede delata, diffundi commemorauimus. Huius uenae interuentu mamillis cum utero communionem esse credimus, eius quippe beneficio ex mamillarum uenis in uterum quum fetus enutritur, sanguinis retractionem: quum autem mulier lactat, ex uteri uenis in mamillarum uenas menstrui sanguinis reuulsionem perfici, medicis pariter concessum est omnibus. Venam enim deorsum ex alto procurantem, ramos mamillarum corpori diffundere, nemo non scribit: etiam si id adeo obiter concessum esse uelimus. Vena uero ab imo sursum conscendens, non ita procul ab uteri uenis originem ducit. Deinde alteram uenam in ortu quasi coniugem sortitur, ad pudendum excurrentem. Exterior enim uenae cauae sinistri trunci ramus, quando supra coxendicis os in femur procidens, peritonaeum transiit, ab interiori ipsius regione aliam promit uenam, quae ad pubis ossium medium qua inuicem cartilaginis interuentu haec uniuntur accedens, uiris in penis inuolutum & scrotum, mulieribus autem in pudendi colliculos, & in coriaceas carunculas (quas uulgu uocant) uicinasque sedes numerosa ramorum serie digeritur. Porro uena sub recto abdominis musculo sursum exporrecta nullam parem adipiscitur, quae in uterum (uti medicorum uulgu arbitratum) descendat: sed ut prius monebam, illa ab his quae in uterum digeruntur non ita multum distat. Quandoquidem ipsius principium ab exteriori ramo sinistri trunci uenae cauae pendet, illis ab interioris eius trunci rami interna propagine originem ducentibus, atque in uteri ceruicem ipsiusque fundi humilior sedem diffusis.

VENAE

PRAETER cauae propaginem, secundum posteriorem sedem in femur aliquousque propagatam, ad crus duae una quidem angustior, quam per pubis ossis foramen anteriorem femoris sedem amplexantes musculos perrepente medium cessare, superiori Capite narrauimus. Altera rarumque uenarum in crus sinistram (quod & de dextrarum paritionis pendet. Praesens uena simulatque peritonaeo elabatur, elatiori ossis sedem ad internum latus sedis, quae sextus & septimus femur mouentium dunt, in inguina labitur, ac anteriorem (uersus interiora tamen magis) femoris & nullo occultata musculo sinui insidet, qui in inguine efficitur a longo tibiae mouentium primo, una cum octauo femoris motuum autore. Vena seu cavitati in cumbes, in plures ramos discinditur, atque quo iniurijs minus rexia, primis suis distributionibus Natura frequentes glandulas (uti in axillis posuit, quae firmam stabilemque uenae propagationem redderent, & quem dixi uena simul, & arteria neruoque hac descendentes opplerent, propugnaculis efficiuntur. Prima huius uenae crus petentis propago insignis est, ac a latere principium ducens, ad anteriorem femoris cutem properat, atque in sedem deorsum per genu quoque interiora, & hinc rursus per internam tibiae malleolum anteriorem sub cute exporrigitur. & deinde in pedis superuariae inibi digeritur, alijs huc pertinentibus uenarum furculis commixta. Haec ita quidem sub cruris cute carne suffultam membrana deorsum prorepere oqua interiori exporrigitur malleolo, uniuersim non eundem seruat ductum. Interdum ab interna tibiae sede secundum anteriorem malleoli regionem ad excurrit, aliquando uero (sed rarius) sub malleolo contorquetur, illac pedis superdens. Deinde in ramorum ad pedis digitos & supra pedion serie, plurimum uenae enim alijs quibusdam ramis hic commixta, ad minimum digitum ipsiusque pue deducitur, aliquando uersus pollicem & indicem excurrit. Breuiter in eodem parem unquam reperias huius propaginis ramorum in utrisque pedibus series quos in descensu profert, rarissime inuicem aut numero, aut amplitudine coquidem inordinate ad cutem permeant, ut plurimum autem in superiorem regionis cutem, non procul a suo ortu, utrobique unam emittit sobolem, ac femoris interiora & inguina, ipsiusque quasi perineum seu interfemineum accedens inter anum & testes, aut muliebri pudendum consistens. Exterior autem crassior est, femoris anteriora & exteriora sub cute perrepans, similiter ac interior digeritur. Quum grandis haec propago ad medium femoris longitudinis quatuor dignos ramos hic etiam in cutem dispergit, & inter ceteros unum musculo porrigit, quem tibiae mouentium primum recensuimus. Ceterum nu articulum uelut ad posteriora orbiculatim ea propago non nihil conuoluit, quae emittit soboles mutuo quidem mole pares, sed exiguas. Vna in anteriorem secundum patellam dispergitur, altera interioris genu sedis uersus genu flexum dit. Haec posterior soboles aliquando penitus deesse, aliquando impense gra tunc scilicet cum propria genu flexus cutem accedens uena, solito amplior uisum sedis tibiae cutem a magna hac propagine, & antrorsum & retrorsum ramul qui impari numero sparsi, rursus cum proximis uenis uarie coeunt, inuicemque tur. Super elatorem uero pedis regionem, uena haec quemadmodum commemorat simode spargitur. Atque haec propaginis per internam cruris cutem deducta Praeter hanc maxima in crus subiens uena e regione nuper dictae propaginis, quae extrorsum ducta in anteriore articuli coxendicis cutem, & eius sedis muscul buitur. Postquam uero maxima uena has edidit propagines, penitus inter musc amplexantes immergitur, & insignem ramum septimo & nono tibiae mouen communicat, a quo etiam tenues furculi in cutem deriuantur. Deinceps aliam n dum distribuit uenam, nuper commemorata ampliorem, quae per quintum fem musculum digeritur, ramosque in octauum tibiae motuum autorem musculum